

■ Demande de réalisation d'une OSTEODENSITOMETRIE

Pour permettre le remboursement éventuel de la patiente ou du patient, il est demandé au médecin prescripteur de l'ostéodensitométrie de préciser les points suivants en cochant les cases correspondantes :

Pour un Premier examen

■ **Quels que soient l'âge et le sexe**

- Fracture vertébrale sans traumatisme majeur
- Fracture périphérique sans traumatisme majeur (sont exclues de ce cadre les fractures du crâne, des orteils, des doigts, du rachis cervical)
- Corticothérapie systémique à long terme
- Hypogonadisme, hyperthyroïdie évolutive non traitée, hypercorticisme, hyperparathyroïdie primitive et ostéogénèse imparfaite.....

■ **Femme ménopausée** (y compris pour les femmes sous traitement hormonal de la ménopause à des doses utilisées inférieures aux doses recommandées pour la protection osseuse), indications supplémentaires (par rapport à la population générale)

- Fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent au 1er degré
- Indice de masse corporelle < 19 kg/m²
- Ménopause avant 40 ans, quelle qu'en soit la cause
- Antécédent de prise de corticoïdes d'une durée d'au moins 3 mois consécutifs, à une dose > 7,5 mg/jour équivalent prednisone.....

Mme ou Mr :

Né(e) le :

Signature patient :

Pour un second examen

Arrêt du traitement anti-ostéoporotique.....

Chez une femme ménopausée sans fracture, lorsqu'un traitement n'a pas été mis en route après une première ostéodensitométrie montrant une valeur normale ou une ostéopénie, une deuxième ostéodensitométrie peut être proposée 3 à 5 ans après la réalisation de la première en fonction de l'apparition de nouveaux facteurs de risque.....

Autre Indication

Autre indication (examen non remboursable)

Mme ou Mr :

Né(e) le :

Signature patient :